

Opgave 5.7

Jakob Stubgaard

6. april 2001

Vi lader $L = \{2, 4, 6, \dots\}$ være mængden af lige tal og $P = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$ være mængden af primtal. Med notation som i afsnit 5.1 skal vi bestemme $\mathbb{D}(\{L, P\})$ samt $\sigma(\{L, P\})$. Enhver σ -klasse skal indeholde hele mængden, dvs. der må gælde at $\mathbb{N} \in \mathbb{D}(\{L, P\})$. Da en σ -klasse ydermere skal være stabil over for komplementærmængdedannelse må mængderne $\emptyset, \mathbb{C}L$ og $\mathbb{C}P$ også tilhøre $\mathbb{D}(\{L, P\})$. Mao. har vi at $\mathbb{D} := \{\emptyset, \mathbb{N}, L, \mathbb{C}L, P, \mathbb{C}P\} \subseteq \mathbb{D}(\{L, P\})$. Hvis vi kan vise at systemet \mathbb{D} er en σ -klasse så må der gælde lighedstegn idet $\mathbb{D}(\{L, P\})$ er den mindste σ -klasse der indeholder L og P . Man checker let at definition 5.1 gælder for systemet \mathbb{D} , idet vi bemærker at de eneste ikke-trivielle *disjunkte* foreninger vi kan danne med mængder fra \mathbb{D} er $L \cup \mathbb{C}L, P \cup \mathbb{C}P$ og $\emptyset \cup \mathbb{N}$. Disse foreningsmængder er alle lig med \mathbb{N} og de tilhører derfor \mathbb{D} . Dermed har vi vist at $\mathbb{D}(\{L, P\}) = \mathbb{D}$, specielt har vi vist at $\mathbb{D}(\{L, P\})$ indeholder netop 6 elementer.

For at bestemme $\sigma(\{L, P\})$ benyttes samme strategi som i opgave 1.5 (jvf. uge 6). Vi danner først de 4 byggesten A_{ij} , $i, j = 0, 1$ som er givet ved $A_{ij} = L_i \cap P_j$, hvor $L_0 = L, L_1 = \mathbb{C}L, P_0 = P$ og $P_1 = \mathbb{C}P$. Mao. er

$$A_{00} = L \cap P = \{2\} \quad \text{og} \quad A_{01} = L \cap (\mathbb{C}P) = \{4, 6, 8, \dots\} \quad (1)$$

$$A_{10} = (\mathbb{C}L) \cap P = \{3, 5, 7, 11, \dots\} \quad \text{og} \quad A_{11} = (\mathbb{C}L) \cap (\mathbb{C}P) = \{1, 9, 15, 21, \dots\} \quad (2)$$

Vi bemærker først at disse 4 mængder er disjunkte og at deres forening er lig \mathbb{N} . At de er disjunkte er klart og at deres foreningsmængde er \mathbb{N} skyldes at ethvert naturligt tal, n , jo enten vil ligge i L eller $\mathbb{C}L$ og tilsvarende for P . Vi vælger derfor den kombination af $L, \mathbb{C}L, P$ og $\mathbb{C}P$ således at $n \in A_{ij}$.

Da $\sigma(\{L, P\})$ er en σ -algebra som indeholder L og P må alle mængderne A_{ij} tilhøre $\sigma(\{L, P\})$ (en σ -algebra er fællesmængdestabil) og da enhver σ -algebra endvidere er foreningsmængdestabil må samtlige tænkelige foreningsmængder af de fire mængder, A_{ij} , også tilhøre $\sigma(\{L, P\})$. Disse foreninger er der netop 16 mulige af (inklusive den tomme forening \emptyset). Antallet af sådanne foreninger er nemlig lig med antallet af delmængder af en mængde på 4 elementer som jo er $2^4 = 16$.

Kan vi vise at mængdesystemet bestående af disse 16 mængder, betegnet \mathbb{E} , udgør en σ -algebra, så gælder at $\sigma(\{L, P\}) = \mathbb{E}$, idet $\sigma(\{L, P\})$ er den mindste σ -algebra der indeholder L og P .

Ifølge ovenstående er \mathbb{N} lig med foreningen af de fire mængde A_{ij} dvs. $\mathbb{N} \in \mathbb{E}$. Endvidere er \mathbb{E} også stabil overfor tællelige foreninger idet hvis $E_1, E_2, \dots \in \mathbb{E}$, så er alle mængderne E_n en forening af de fire mængder A_{ij} , og derfor vil $\cup_n E_n$ også være det. Endelig er \mathbb{E} også stabil overfor komplementærmængdedannelse, idet hvis E er en forening af nogle af A_{ij} 'erne så er $\mathbb{C}E$ lig med foreningen af de resterende A_{ij} 'er (mængderne A_{ij} var disjunkte og deres forening var \mathbb{N}). Altså er \mathbb{E} en σ -algebra, og hermed er det vist at antallet af elementer i $\sigma(\{L, P\})$ er netop 16. I denne opgave har vi altså et eksempel på en σ -klasse som *ikke* er en σ -algebra.

I opgave 1.5 viste vi, ved samme bevis som her, at antallet af elementer i $\sigma(\{L, P\})$ var højst 16, men hvis beviset gås efter ser man, at grunden til, at vi får netop 16 elementer i denne opgave, er, at de fire byggesten, A_{ij} , er ikke-tomme.