

## Reel analyse og lineær algebra (Matematik H1)

### Erhvervsøkonomi-matematik studiet

4 timers skriftlig prøve

Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke regnemaskiner af nogen art.  
Sættet er på 3 sider og består af 6 opgaver.

#### Opgave 1 (Vægt 15%)

Lad

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

- 1) Bestem de værdier af  $a \in \mathbb{R}$ , for hvilke  $\det A = 0$ .
- 2) Find for ethvert  $a \in \mathbb{R}$  den fuldstændige løsning til ligningssystemet

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

#### Opgave 2 (Vægt 15 %)

Det oplyses, at nedenstående problem har en løsning

$$\text{mimimér } x^2 + y^2 + z^2$$

$$\text{under bibetingelserne } x + y = 3, y - z = 3.$$

- 1) Find denne løsning ved Lagrange's metode.
- 2) Opstil dernæst en parameterfremstilling for de  $(x, y, z)$ , der tilfredsstiller bibetingelserne, og anvend denne til at begrunde, at det tilsvarende maksimeringsproblem ikke har nogen løsning.

**Opgave 3** (Vægt 15 %)

Betragt matricen

$$\underline{\underline{M}}(a) = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix},$$

hvor  $a \in \mathbb{R}$ .

- 1) Begrund, at  $\underline{\underline{M}}(a)$  er diagonaliserbar m.h.t. en ortonormal basis for ethvert  $a \in \mathbb{R}$ .
- 2) Vis, at søjlevektorerne

$$\underline{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \underline{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

er egenvektorer for  $\underline{\underline{M}}(a)$ , og bestem de tilhørende egenverdier. Bestem en egentlig vektor  $\underline{v}_3 \in \mathbb{R}^3$ , som er ortogonal på  $\underline{v}_1$  og  $\underline{v}_2$ , og vis, at  $\underline{v}_3$  er en egenvektor for  $\underline{\underline{M}}(a)$ .

3) Bestem en ortogonal matrix  $\underline{\underline{S}}$ , således at  $\underline{\underline{S}}\underline{\underline{M}}(a)\underline{\underline{S}}^{-1} = \underline{\underline{D}}(a)$  er en diagonalmatrix, og angiv også  $\underline{\underline{D}}(a)$ .

**Opgave 4** (Vægt 20 %)

Lad

$$f(x, y) = 3x^2 - 5xy + 2y^2 - x + y, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

1) Bestem samtlige stationære punkter for  $f$ , og afgør om  $f$  har lokalt minimum, lokalt maksimum eller sadelpunkt i de fundne punkter.

2) Lad

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}.$$

Skitsér området, og begrund, at  $f$  har både en største- og en mindsteværdi i  $A$ .

- 3) Bestem derpå største- og mindsteværdien for  $f$  i  $A$ .
- 4) Udregn

$$\int \int_A (2y - x) \, dx \, dy.$$

**Opgave 5** (Vægt 20 %)

Betragt vektorerne

$$\underline{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \underline{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \underline{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \underline{b}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \underline{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) Vis, at  $(\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{a}_3)$  er en basis for  $\mathbb{R}^3$ , og at  $(\underline{b}_1, \underline{b}_2)$  er en basis for  $\mathbb{R}^2$ .
- 2) Opskriv koordinattransformationsmatricen  $\underline{S}^{-1}$  for overgang fra  $(\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{a}_3)$  til den naturlige basis for  $\mathbb{R}^3$ , og koordinattransformationsmatricen  $\underline{T}^{-1}$  for overgang fra  $(\underline{b}_1, \underline{b}_2)$  til den naturlige basis for  $\mathbb{R}^2$ .
- 3) En lineær afbildning  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  er givet ved

$$f(\underline{a}_1) = \underline{b}_1 + \underline{b}_2, f(\underline{a}_2) = \underline{b}_2 - \underline{b}_1, f(\underline{a}_3) = \underline{b}_2.$$

Angiv den matrix  $\underline{\tilde{A}}$ , som repræsenterer  $f$  m.h.t. baserne  $(\underline{a}_1, \underline{a}_2, \underline{a}_3)$  og  $(\underline{b}_1, \underline{b}_2)$ .

- 4) Bestem den matrix  $\underline{A}$ , som repræsenterer  $f$  m.h.t. de naturlige baser.

**Opgave 6** (Vægt 15 %)

Det oplyses, at ligningen

$$e^{\sin(x-2y)} + \sin y - 1 = 0$$

i en omegn af  $(0,0)$  bestemmer  $y = f(x)$  som en  $C^2$ -funktion af  $x$ . Udregn det 2. Taylorpolynomium for  $f(x)$  i udviklingspunktet  $x = 0$ . Vink: Man kan få brug for differentiationsreglen:  $(FGH)' = F'GH + FG'H + FGH'$ .

Skitsér grafen for  $f$  i et lille interval omkring 0.